



ประเด็นคำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการรับวัคซีนโควิด-19

รวบรวมโดย ทีมวิชาการและข้อมูลข่าวสารวัคซีนโควิด จังหวัดสระบุรี

เรียบเรียงเมื่อวันที่ 24 พค. 2564



ข้อ	หัวข้อ/คำถาม	คำตอบ	คำแนะนำเพิ่มเติม	แหล่งอ้างอิง
โรคประจำตัวที่เกี่ยวข้อง				
1	โรคประจำตัวอะไรบ้าง ที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ หรือต้องระมัดระวังในการฉีดวัคซีน	ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังที่อยู่ในภาวะอาการกำลั้งกำเริบ อาการยังไม่สงบ	นอกจากนี้ยังมีโรคประจำตัวที่ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ ได้แก่ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ไต ปอด ฯลฯ ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องรุนแรง (ยังไม่มีรายงานรับรองความปลอดภัย) ผู้ป่วยที่กำลังอยู่ในระหว่างการให้ยาเคมีบำบัด คีโม ยากดภูมิคุ้มกัน หรือเข้ารับการรักษาด้วยยาบางชนิด อาจต้องหยุดยาบางชนิดก่อนฉีดวัคซีน หญิงตั้งครรภ์ สตรีให้นมบุตร รวมถึงผู้หญิงที่ไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนฉีดวัคซีน	1.สสส. www.thaihealth.or.th/ 2.กรมควบคุมโรค
2	โรคหัวใจและหลอดเลือด	ฉีดวัคซีนได้	-ยกเว้นผู้ป่วยที่อาการไม่คงที่ ยังมีอาการที่อันตรายถึงชีวิต ยังไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีน ให้รอจนกว่าอาการจะดีขึ้นค่อยฉีดวัคซีน -กรณีที่มีความดัน SBP>160 mmHg ควรควบคุมความดันให้ดีก่อนฉีดวัคซีน	1.www.thaihealth.or.th 2.สถาบันทรวงอก 3.สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้อ	หัวข้อ/คำถาม	คำตอบ	คำแนะนำเพิ่มเติม	แหล่งอ้างอิง
3	โรคไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต ไตผู้ป่วยปลูกถ่ายไต	ฉีดวัคซีนได้		สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
4	โรคเบาหวาน	ฉีดวัคซีนได้		1.สสส. www.thaihealth.or.th/ 2.กรมควบคุมโรค
5	โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	ฉีดวัคซีนได้	-ในกลุ่มผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไม่มีข้อห้ามที่เฉพาะเจาะจงต่อวัคซีนทั้ง 4 ชนิด (ชนิด Viral vector , mRNA , Inactivated , Protein-based vaccine) -ฉีดหลังอาการกำเริบ 2-4 สัปดาห์ เพื่อลดอาการกำเริบซ้ำของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในกรณีที่มีร่างกายกำลังฟื้นฟู -ในผู้ป่วยโรคหอบหืด ที่ได้รับยากกลุ่ม Biological drug เช่น Anti-Ig E , anti IL-5 ให้ฉีดยาดังกล่าวตามระยะเวลาปกติ โดยการฉีดวัคซีนควรห่างจากยากกลุ่มดังกล่าวประมาณ 7 วัน - ไม่แนะนำให้หยุดยากกลุ่ม Steroid หรือยากดภูมิที่ใช้กินระยะยาว เช่น Metrotrexate , Mycophenolate mofetil สามารถใช้ยาต่อเนื่องทั้งก่อนและหลังฉีด	กรมการแพทย์ กลุ่มงานอายุรกรรมปอด สถาบันทรวงอก
6	โรคหืด	ฉีดวัคซีนได้	-ฉีดวัคซีนได้ไม่เป็นข้อห้ามสำหรับวัคซีนทุกชนิด ควรฉีดในผู้ป่วยที่คุมอาการได้ ไม่มีอาการกำเริบ -ไม่จำเป็นต้องหยุดยาควบคุมโรคก่อนไปฉีดวัคซีน (ไม่มี	คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคหืด ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย

ข้อ	หัวข้อ/คำถาม	คำตอบ	คำแนะนำเพิ่มเติม	แหล่งอ้างอิง
			หลักฐานว่ายา ICS มีผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันที่กระตุ้นจากการฉีดวัคซีน) -เว้นระยะเวลาอย่างน้อย 7 วัน จากการได้รับยาชีวโมเลกุล เช่นยา Omalizumab , Benralizumab, Dupilumab	
7	โรคอ้วน (น้ำหนัก>100 kg หรือ Body Mass Index (BMI)> 35 kg/m ²)	ฉีดวัคซีนได้		1.สสส. www.thaihealth.or.th/ 2.กรมควบคุมโรค
8	โรคมะเร็ง	ฉีดวัคซีนได้	-ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ไม่ใช่มะเร็งระบบเลือด สามารถฉีดวัคซีนได้เลย -ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่กำลังได้รับการผ่าตัด หรือกำลังได้รับยาเคมีบำบัดควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อนเพื่อพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสม -ผู้ป่วยมะเร็งระบบเลือดที่ได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูก ควรฉีดวัคซีนหลังจากรักษาครบ 3 เดือนไปแล้ว และควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษา -สามารถฉีดวัคซีนได้ทุกชนิดที่ได้รับอนุมัติจาก ออย.ไทย เช่น Sinovac , AstraZeneca	มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
9	โรคหลอดเลือดสมอง	ฉีดวัคซีนได้	ยกเว้นผู้ป่วยที่มีอาการยังไม่คงที่หรือยังมีอาการที่อันตรายต่อชีวิต 1ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อน	แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ป่วยระบบประสาท
10	โรคลมชัก	ฉีดวัคซีนได้	ระวังใช้หลังฉีดวัคซีนอาจกระตุ้นอาการชักได้ ผู้ป่วยต้องมีอาการทางระบบประสาทคงที่ หรือไม่อยู่ใน	สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ข้อ	หัวข้อ/คำถาม	คำตอบ	คำแนะนำเพิ่มเติม	แหล่งอ้างอิง
			ภาวะอันตรายต่อชีวิตอย่างน้อย 4 สัปดาห์	
11	โรคอื่นทางระบบประสาท เช่น พาร์กินสัน สมองเสื่อม โรคเส้นประสาท โรคเซลล์สั่งการเสื่อม หรืออื่นๆ	ฉีดวัคซีนได้ตามปกติ	ผู้ป่วยต้องมีอาการทางระบบประสาทคงที่ก่อน	สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
12	โรคภูมิคุ้มกันระบบประสาทหรือกินยากดภูมิคุ้มกันอยู่	ฉีดวัคซีนได้	-ผู้ป่วยต้องมีอาการทางระบบประสาทคงที่ก่อน อย่างน้อย 4 สัปดาห์ -ห้ามฉีดวัคซีนชนิดเชื้อเป็น (Live-attenuated vaccine) โดยพิจารณาหลีกเลี่ยงการใช้วัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์และเลือกใช้วัคซีนชนิดเชื้อตาย ชนิด mRNA หรือ ชนิด ส่วนประกอบของโปรตีน -ถ้ายังไม่เริ่มยา วัคซีนเข็มแรกฉีดได้เลย ส่วนเข็มที่ 2 ฉีดก่อนเริ่มยา 4 สัปดาห์	สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
13	โรคเอดส์	ฉีดวัคซีนได้	ผู้ติดเชื้อ HIV ควรได้รับการฉีดวัคซีนโควิด เนื่องจากวัคซีนสามารถป้องกันอาการโควิดที่รุนแรงได้ แม้ว่าจะไม่มีข้อมูลรับรองประสิทธิภาพในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV มากพอ ทั้งนี้การตอบสนองต่อวัคซีนจะแตกต่างกันขึ้นกับระดับ CD4 และปัจจัยทางสุขภาพของผู้รับวัคซีน อาการข้างเคียงของวัคซีนไม่แตกต่างจากประชากรกลุ่มอื่น	คำแนะนำการรับวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
14	โรคข้ออักเสบและโรคแพ้ภูมิตัวเอง	ฉีดวัคซีนได้	สามารถฉีดวัคซีนได้ทั้งยี่ห้อ AstraZeneca และ Sinovac ขึ้นกับการเข้าถึงได้ ทั้งนี้ให้ปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลในกรณีที่	หน่วยโรคภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันวิทยาและโรคข้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี (ปรับปรุงจาก

ข้อ	หัวข้อ/คำถาม	คำตอบ	คำแนะนำเพิ่มเติม	แหล่งอ้างอิง
			โรครุนแรงหรือยังคงควบคุมอาการของโรคไม่ได้	American College of Rheumatology)
ยาโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้อง				
1	Warfarin	ฉีดวัคซีนได้โดยต้องมีค่า INR < 3	ควรใช้เข็มขนาดเล็กกว่า 23G และไม่ควรรคถึงกล้ามเนื้อ หลังฉีดวัคซีน และควรกดตำแหน่งที่ฉีดหลังจากฉีดยา นาน กว่าปกติ อย่างน้อย 2 นาที หรือจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มี เลือดออกผิดปกติ	1.แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ป่วยระบบ ประสาท 2.สถาบันทรวงอก 3.สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์
2	ASA, Clopidogrel, Cilostazol, Ticagrelor , Prasugrel	ฉีดวัคซีนได้ โดยไม่ต้อง หยุดยา		
3	NOACs (Apixaban , Rivaroxaban, Dabigatran, Edoxaban)	ฉีดวัคซีนได้ โดยไม่ต้อง หยุดยา		
4	Methotrexate	ฉีดได้ โดยหยุดยา Methotrexate 1 สัปดาห์ หลังการฉีดวัคซีนในแต่ละ ครั้ง แล้วจึงให้ยาต่อ ตามปกติ (เฉพาะผู้ป่วยที่มี อาการคงที่) ต้องปรึกษา แพทย์ผู้รักษาก่อนเสมอ	หลีกเลี่ยงการใช้วัคซีน ชนิดไวรัสเวกเตอร์และเลือกใช้วัคซีน ชนิดเชื้อตาย ชนิด mRNA หรือชนิดส่วนประกอบของ โปรตีน **กรณีใช้ในผู้ป่วยโรค โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด ไม่ แนะนำให้หยุดยา สามารถใช้ยาต่อเนื่องทั้งก่อนและหลังฉีด	สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มงานอายุรกรรมปอด สถาบันทรวงอก
5	Prednisolone	ฉีดวัคซีนได้	สำหรับผู้ป่วยโรกระบบประสาทที่ใช้ยามากกว่า 20 mg/วัน หรือเทียบเท่า ให้ ฉีดวัคซีนหลังการให้ยาสเตียรอยด์โดส สุดท้ายประมาณ 5 วันร่วมกับพิจารณาอาการของตัวโรค กรณีใช้น้อยกว่า 20 mg/วัน สามารถให้การฉีดวัคซีน	แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 สำหรับผู้ป่วยโรกระบบ ประสาท โดย สถาบันประสาทวิทยา กรมการ แพทย์สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

ข้อ	หัวข้อ/คำถาม	คำตอบ	คำแนะนำเพิ่มเติม	แหล่งอ้างอิง
			โดยไม่ต้องหยุดยา	และเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบัน แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet)
6	Intravenous immunoglobulin (IVIg)	ฉีดวัคซีนได้	สามารถฉีดวัคซีนได้โดยตัวยาไม่มีผลต่อวัคซีน	
7	Azathiopine , Mycophenolate , Cyclophosphamide ชนิดกิน	ฉีดวัคซีนได้	ฉีดวัคซีนได้ไม่ต้องหยุดยา	
8	Cyclophosphamide ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำ	ฉีดวัคซีนได้	ให้วางแผนการฉีดวัคซีนก่อนเริ่มให้ยา cyclophosphamide 1 สัปดาห์ในกรณีที่สามารถทำได้	
9	Rituximab	ฉีดวัคซีนได้	ให้วางแผนการฉีดวัคซีนก่อนให้ยา rituximab ประมาณ 4 สัปดาห์หรือหากได้ยา rituximab ไปแล้ว ให้วางแผนการ ฉีดวัคซีนหลังการให้ยา rituximab ไปแล้วอย่างน้อย 4-12 สัปดาห์	
10	Interferon-beta, Glatiramer acetate, Dimethyl fumarate, Teriflunomide, Natalizumab	ฉีดวัคซีนได้	ฉีดวัคซีนได้ไม่ต้องหยุดยา	

ข้อ	หัวข้อ/คำถาม	คำตอบ	คำแนะนำเพิ่มเติม	แหล่งอ้างอิง
คำถามที่เกี่ยวข้องอื่นๆ				
1	หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรสามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่	ฉีดวัคซีนได้	แนะนำให้ฉีดวัคซีนช่วงหลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์เป็นต้นไป และแนะนำให้ฉีดวัคซีน Sinovac ก่อน เนื่องจากผลผลิตจากเชื้อที่ตายแล้ว ในขณะที่ AstraZeneca เป็น viral vector vaccine มีโอกาสเกิดอาการไขหลังฉีดได้มาก และมีรายงานการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหญิงที่อายุน้อยกว่า 30 ปี แต่พบน้อยมาก	กรมอนามัย โดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ
2	ฉีดนานแค่ไหนถึงจะมีภูมิคุ้มกันขึ้น	CDC ได้แนะนำว่า โดยทั่วไปจะใช้เวลา 2 สัปดาห์หลังจากฉีดวัคซีน เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน โดยภูมิคุ้มกันจะเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ หลังจากได้รับวัคซีนไปแล้วจนครบ 2 เข็ม		CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html (Updated May 12, 2021)
3	สามารถฉีดวัคซีนอื่น เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนพิษสุนัขบ้า วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก วัคซีนรวมหัด-หัดเยอรมัน พร้อมกับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ใน	ให้เลี่ยงการรับวัคซีนโควิด 19 และวัคซีนชนิดอื่นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีนโควิดและวัคซีนที่	เนื่องจากวัคซีนโควิด 19 เป็นวัคซีนที่ผลิตออกมาไม่นาน และยังไม่มียข้อมูลเกี่ยวกับการให้วัคซีนนี้ควบคู่กับวัคซีนอื่น จึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงเพื่อเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีนพร้อมกันและการรบกวนการสร้างภูมิคุ้มกัน แต่วัคซีนที่มีความจำเป็น เช่น เมื่อถูกสัตว์กัดให้ฉีดวัคซีนพิษ	กรมควบคุมโรค

ข้อ	หัวข้อ/คำถาม	คำตอบ	คำแนะนำเพิ่มเติม	แหล่งอ้างอิง
	คราวเดียวกันได้หรือไม่ หากไม่สามารถให้พร้อมกันได้ ควรเว้นระยะห่างนานเท่าไร	ต้องการใช้ร่วม	สุนัขบ้าได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องทิ้งช่วงเวลาเนื่องจากความเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้ามีความสำคัญกว่า	
4	หากเคยเป็นผู้ป่วยโควิด ยังต้องรับวัคซีนโควิดหรือไม่	โอกาสติดเชื้อซ้ำได้ตั้งนั้น ควรได้รับวัคซีนโควิด	โดยเว้นระยะห่างจากการติดเชื้อไปอย่างน้อย 3-6 เดือน ไม่จำเป็นต้องตรวจการติดเชื้อก่อนฉีดวัคซีน	กรมควบคุมโรค